

SỞ Y TẾ NGHỆ AN  
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

Số: 10 /YTDP-TCMR  
V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 12 tháng 01 năm 2019

**KHẨN**

Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện/thành/thị.

Thực hiện chỉ đạo của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương tại công văn số 1993/VSDTTU-TCQG ngày 28/8/2018 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Theo đó, để đảm bảo công tác tổ chức triển khai tiêm vắc xin ComBE Five trong tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An đề nghị Trung tâm Y tế các huyện/thành/thị chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo các điểm tiêm chủng thực hiện nghiêm túc:

- Tiêm vắc xin ComBE Five vào buổi sáng để có thời gian phù hợp cho việc theo dõi các sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

- Lắc và quan sát lọ vắc xin ComBE Five trước khi sử dụng để đánh giá tình trạng cảm quan.

- Công tác khám sàng lọc trước tiêm chủng, tuân thủ đúng chỉ định/chống chỉ định/tạm hoãn theo qui định của Bộ Y tế tại Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 16/06/2015 về Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

- Tư vấn/dặn dò đầy đủ cho các bậc cha mẹ một số nội dung cụ thể như sau:

+ Nếu thời tiết lạnh, cần giữ ấm cho trẻ khi đi tiêm chủng.

+ Theo dõi trẻ tại nhà trong vòng 1-2 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: tinh thần; bú mẹ; ăn; ngủ; thở; nhiệt độ; phát ban; phản ứng tại chỗ tiêm... để có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về sức khỏe và chủ động thông báo cho cán bộ y tế về các phản ứng sau tiêm chủng để được hướng dẫn xử trí tại nhà đúng cách.

+ Nếu trẻ sốt thì cần cẩn thận theo dõi, dùng đúng loại thuốc hạ sốt dành cho trẻ theo sự chỉ dẫn của cán bộ y tế.

+ Đưa NGAY trẻ tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế gần nhất nếu trẻ có các dấu hiệu như: sốt cao  $\geq 39^{\circ}\text{C}$ , co giật, phát ban, khóc thét dai dẳng, li bì, bú kém, khó thở, tím tái,... hoặc khi phản ứng thông thường nhưng kéo dài trên 1 ngày.

+ Nếu cha mẹ không yên tâm về sức khỏe của con mình sau khi tiêm chủng hãy đến gặp cán bộ y tế để được khám và tư vấn.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát buổi tiêm chủng, đặc biệt giám sát hỗ trợ tại các xã khó khăn có điểm tiêm chủng ngoài trạm/xa trung tâm đảm bảo thực hiện đúng qui trình tiêm chủng an toàn theo quy định.

3. Tăng cường truyền thông cho các bậc cha mẹ và cộng đồng về việc chuyển đổi sử dụng vắc xin ComBE Five, tính an toàn của vắc xin, những phản ứng có thể xảy ra, chăm sóc trẻ đúng sau tiêm chủng để tránh hiểu sai dẫn đến không đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ.

4. Báo cáo nhanh lên tuyến trên danh sách các trường hợp phản ứng phải nhập viện sau tiêm chủng vắc xin ComBE Five nếu có (*mẫu được gửi qua email*).

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Nhu trên;
- Sở Y tế;
- LĐ trung tâm;
- Khoa KSBTN;
- Lưu: VT, TCMR.



Nguyễn Văn Định