

SỞ Y TẾ NGHỆ AN  
TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU

Số: 50 /TTYT-DP  
V/v: Tăng cường các hoạt động  
Phòng, chống bệnh Sởi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quỳ Châu, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Trưởng trạm y tế 12 xã, thị trấn Tân Lạc.

Trong thời gian qua, Trung tâm y tế đã tiếp nhận một số ca bệnh sởi vào điều trị và đã có trường hợp có biến chứng nặng; Thực hiện công văn số 1307/SYT-NVY ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Sở Y tế Nghệ An Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Sởi, Giám đốc Trung tâm y tế yêu cầu Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn Tân Lạc thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Triển khai các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi tại cộng đồng, tiến hành cách ly, xử trí kịp thời theo đúng quy định, tuyệt đối không để lây lan rộng gây thành dịch trên địa bàn.
2. Tiến hành rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm vắc xin sởi hoặc chưa tiêm đầy đủ mũi trên địa bàn, lập kế hoạch tổ chức tiêm bổ sung trong thời gian sớm nhất; Số liệu cụ thể gửi về bộ phận tiêm chủng Khoa KSBT – HIV/AIDS trong tháng 5/2019 để có kế hoạch dự trù vắc xin kịp thời. (đặc biệt chú ý số trẻ tiêm vắc xin sởi tại các đơn vị phải đạt > 95%, nơi nào còn thấp cần lập kế hoạch tiêm bổ sung).
3. Tổ chức truyền thông về nguy cơ mắc bệnh sởi, các biện pháp phòng chống và tránh lây lan trong cộng đồng để người dân chủ động thực hiện (qua loa truyền thông của xã/ bản, y tế bản...). tuyên truyền rõ lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin sởi, và vận động người dân đưa trẻ đi tiêm đủ mũi và đúng lịch.
4. Tổ chức thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh nhân; chuyển tuyến kịp thời đối với bệnh nhân nặng, có biến chứng, không để xảy ra tử vong.
5. Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số: 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nhận được Công văn này yêu cầu Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn Tân Lạc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và kịp thời./.

**Người nhận:**

- Như kính gửi;
- GĐ, các PGD (B/c);
- Lưu: VT, Khoa KSBT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Võ Văn Thắng

## BÀI TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỎI, RUBELLA

Sởi, rubella là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây ra.

Bệnh lây theo đường hô hấp qua các giọt bắn dịch tiết từ đường hô hấp của người mắc bệnh hoặc cũng có thể qua tiếp xúc trực tiếp.

Mọi người chưa bị mắc bệnh sởi bao giờ hoặc chưa được tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi, rubella đầy đủ đều có thể bị mắc sởi, rubella.

Bệnh sởi, rubella rất dễ lây lan vì vậy có thể tạo thành các ổ dịch tại các lớp học, cộng đồng hoặc trong bệnh viện khi có một trường hợp mắc bệnh.

Biểu hiện của bệnh là sốt, phát ban và viêm long đường hô hấp; bệnh có thể có các biến chứng nặng như: viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, viêm não... và dễ dẫn đến tử vong.

Để chủ động phòng chống bệnh sởi, rubella, ngành Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau:

1. Hãy đưa trẻ đi tiêm phòng bệnh sởi, rubella ngay từ khi trẻ đủ 9 tháng tuổi và tiêm nhắc lại mũi 2 khi trẻ đủ 18 tháng tuổi.

2. Người lớn chưa bị mắc bệnh sởi, rubella hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ trong gia đình có trẻ nhỏ, phụ nữ trước khi mang thai 3 tháng cần chủ động đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi, rubella tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ để phòng bệnh cho chính bản thân, cho trẻ sau khi sinh ra hoặc tạo miễn dịch cộng đồng xung quanh bảo vệ trẻ đã sinh.

3. Thường xuyên vệ sinh đường mũi, họng, mắt hàng ngày cho trẻ. Với người lớn sau khi đi ngoài đường về, cần vệ sinh mũi họng, bàn tay, thay quần áo rồi mới tiếp xúc với trẻ.

4. Thường xuyên mở cửa sổ, cửa chính để ánh nắng chiếu vào, bật quạt để thông thoáng khí, dùng nồi nước lá xông để khử trùng không khí cho nhà ở, lớp học của nhà trẻ, mầm non, mẫu giáo, phòng học của các trường, phòng làm việc, phòng hội họp tập trung đông người.

5. Thông báo cho trạm y tế xã phường ngay khi có biểu hiện sốt, phát ban để được khám, điều trị và hướng dẫn cách ly kịp thời.

6. Hạn chế tiếp xúc với người mắc/nghi mắc bệnh, khi phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế và các trang bị phòng hộ cá nhân. Phụ nữ có thai tuyệt đối không tiếp xúc với người mắc bệnh sởi, rubella.

7. Không cho trẻ em dùng chung vật dụng cá nhân (khăn mặt, bàn chải, kính, cốc, chén, bát, đũa..), đồ chơi hoặc đồ vật dễ bị ô nhiễm chất tiết mũi họng của người mắc bệnh. Làm sạch vật dụng cá nhân, đồ chơi, đồ vật nghi bị ô nhiễm chất tiết mũi họng của người mắc bệnh bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường với nước sạch.

8. Lau sàn nhà, nấm đẩm cửa, mặt bàn, ghế, khu vệ sinh chung hoặc bề mặt của đồ vật nghi ngờ bị ô nhiễm dịch tiết mũi họng của bệnh nhân bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường từ 1 – 2 lần/ngày.

9. Cho trẻ ăn uống đủ chất, dinh dưỡng hợp lý.

10. “Tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng chống bệnh sởi !”

**“Hãy đưa trẻ từ 1- 5 tuổi đi tiêm vắc xin phòng bệnh sởi-rubella tại các trạm y tế”**